

Reanimando



Enseñamos a Salvar Vidas



T. 93 747 16 69
M. 695 348 880
info@reanimando.es
www.reanimando.es

SÍGUENOS EN:



ANTES DE ACTUAR



Primero protégete tú primero, no te lastimes en el intento. Protege a la víctima y que la zona sea segura para poder actuar.



Evalúa la situación y llama a emergencias. En Europa es un número único: 1-1-2. Puedes llamar sin cobertura, tarjeta SIM ni desbloquear el teléfono.




Socorre a la víctima. Prestar auxilio es tan simple como quedarse con la víctima y llamar a emergencias. No estamos obligados a tener conocimientos médicos. Si pasamos de largo ante un accidente será omisión del deber de socorro.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Evaluar lo que ocurre y no ponerse en peligro
- Mantener la calma y actuar rápido
- No mover al herido si no es completamente indispensable
- Examinar al herido y no dejar que se enfríe
- NO dar nada de beber si la víctima está inconsciente
- Tranquilizar a víctima y a familiares

ICTUS



ICTUS

El ictus es la interrupción de la circulación de sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o ha quedado taponado. Cuando esto ocurre, la sangre no llega a una determinada zona del cerebro, de modo que las células nerviosas afectadas no reciben oxígeno y mueren. De ahí, la importancia de actuar con la máxima rapidez.


Según el mecanismo de la lesión se distinguen dos tipos de ictus:

- **Ictus isquémico** (o infarto cerebral) originado por la obstrucción del flujo sanguíneo.
- **Ictus hemorrágico** (o hemorragia cerebral) en el que la rotura de un vaso provoca la salida de sangre y la compresión de estructuras del sistema nervioso central.

¿A cuantas personas afecta?

1/6

**PERSONAS TENDRÁ
UN ICTUS A LO LARGO
DE SU VIDA**



CADA  **6** **MIN.**

**SE PRODUCE UN ICTUS
EN ESPAÑA**

CADA  **14** **MIN.**

**MUERE UN PACIENTE POR
ICTUS EN ESPAÑA**

ICTUS

Los síntomas más habituales son:

- Pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo (cara, brazo y pierna del mismo lado).
- Dificultad para hablar.
- Pérdida de sensibilidad u hormigueos en la mitad del cuerpo.
- Pérdida súbita de visión en un ojo.
- Dolor de cabeza muy intenso distinto del habitual.

Realice estas comprobaciones para asegurarse:



Caída de la cara, alteración de la sensibilidad.




Pérdida de fuerza en uno de brazo



Confusión, problemas de habla, problemas de comprensión



Mareo sin motivo aparente



Visión borrosa, alteraciones en la visión



Dolor de cabeza fuerte inusual, de inicio súbito

Si reconoce alguno de estos signos y síntomas, llame al 1-1-2 y aguarde su llegada al lado de la víctima.

**"nada hay más trágico
que una muerte que se pudo evitar"**

Reanimando

Learn to save a life

SÍGUENOS EN:



**Gran Vía Carles III, nº 98, Planta 10.
08028 - Barcelona**